



Michael S. Hwahng, D.D.S.

Quality, Compassionate Care.

INSTRUCCIONES PARA DESPUÉS DE UNA EXTRACCIÓN

1. Muerde la gasa con firme presión por una hora. En caso de que continúe sangrando cambie la gasa y muerdela fuertemente por media hora.
2. Evite escupir y/o fumar por las siguientes 24 horas.
3. Evite lastimar la herida.
4. **HINCHAZÓN:** Coloque en una bolsa hielo y cubrirlo con una toalla delgada para que la aplique el lado afectado por 30 minutos. Esto lo puede repetir varias veces los primeros 2 días.
5. **DOLOR:** Si el dolor es leve o promedio puede tomar cualquier medicamento que NO CONTENGA ASPIRINA para aliviarlo. En caso de que el dolor en un poco más intenso puede tomarse el medicamento que le hemos prescrito:

MOTRIN 800 mgs.

Este medicamento es para el dolor, tomarlo 1 cada 8 horas según tenga dolor, sino tiene dolor no es necesario que lo tome. Debe tomarlo con comida o con un vaso de leche porque puede ser fuerte para su estómago.

6. **INFECCIÓN:** para eliminar o prevenir una infección se le recomienda tomar el medicamento que le hemos prescrito:

Z PAK 250 mgs

Es un antibiótico para combatir las infeccion. Este es un tratamiento que es estrictamente medicado para tomar 2 pastillas el primer día, despues 1 pastilla por 4 días

7. Una DIETA BLANDA es recomendable por las primeras 24 horas. Evite tomar líquidos calientes, bebidas alcohólicas o bebidas carbonatadas(sodas).
8. El descansar acostado es o mejor, mantenga elevada la cabeza con dos almohadas. Evite objetos pesados y estar en áreas muy calientes por los siguientes dos días.

SE LE RECOMIENDA SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES
PARA QUE SU RECUPERACION SEA RAPIDA!

2628 Pleasant Hill Rd, Suite 300 Duluth, Ga 30096

Telephone (770)622-7758